


CONDUITES SUICIDAIRES



**Chiffres clés dans le
département de l'Ariège**

Mise à jour
Juillet 2025



LES CONDUITES SUICIDAIRES

De quoi s'agit-il ?



Les conduites suicidaires sont définies par l'HAS¹ comme la catégorie recouvrant la part actée du **processus suicidaire**, c'est-à-dire les **tentatives de suicide et l'ensemble des comportements préparatoires au passage à l'acte**.


L'OMS² indique que « *le terme suicide se réfère à l'acte de se donner délibérément la mort* » et « *le terme tentative de suicide* » est employé pour se référer à « ***tout comportement suicidaire non mortel et à un acte d'auto-intoxication, d'auto-mutilation ou d'auto-agression avec intention de mourir ou pas*** ».

L'OMS souligne également que « *l'intention de suicide peut être **difficile à évaluer du fait de l'ambivalence et de la dissimulation qui lui sont associées*** ».

Le suicide, « longtemps resté tabou », cause majeure de décès prématurés, constitue aujourd'hui un **enjeu majeur de santé publique**.³



Près de **24**
décès/jour
en France⁴



REPERES METHODOLOGIQUES

Sources de données mobilisées et points de vigilance

> **Tentatives de suicide (TS) :** Hospitalisations et recours aux urgences :

- **Surveillance des urgences⁵ :** **SurSaUD® - réseau Oscour®** (année 2024) - Indicateur : geste suicidaire (passages aux urgences en lien avec un geste suicidaire certain (auto-intoxications et lésions auto-infligées) ou probable (intoxications médicamenteuses, effet toxique de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée) chez les 11 ans et plus. Données fournies par lieu de consultation et non lieu de résidence des patients.
- **Hospitalisations chez les 10 ans et plus :** **SNDS** (Bases du PMSI-MCO, années 2021, 2022, 2023)

> **Suicide :** Décès par suicide chez les 10 ans et plus - Statistique nationale des décès - **Inserm- CépiDC** (Certificats de décès –Dernières années disponibles régionales et départementales 2020, 2021, 2022).

Quelques points de vigilance :

- ❗ **Qualité des données :** liée à la transmission des données et à la qualité du codage des diagnostics.
- ❗ **Données provenant uniquement du système de soins en établissement :** seules les TS ayant donné lieu à un passage aux urgences et/ou à une hospitalisation en MCO sont recensées.
- ❗ **Défaut d'exhaustivité global des décès par suicide :** estimé à 10 % en France Hexagonale.⁶
- ❗ **Interprétation des résultats de mortalité par suicide :** une prudence est recommandée pour les résultats à partir de 2018. Ces résultats ne doivent pas être comparés à des années antérieures en raison d'une rupture statistique due à des améliorations dans la collecte et la remontée d'informations (Sources : Inserm CépiDC, DREES).

Exploitation des données

- **ORM Occitanie :** hospitalisations en MCO pour tentative de suicide et décès par suicide. Les codes retenus pour le suicide sont X60 à X84 (causes initiales ou associées). Les données sont présentées selon le lieu de résidence des personnes concernées.
- **Cellule Occitanie de Santé Publique France :** surveillance des urgences, analyse des données pour tentative de suicide. Un suivi épidémiologique régional est réalisé à partir de l'analyse d'indicateurs de santé mentale issus des passages aux urgences (réseau Oscour®) : troubles psychiques et gestes suicidaires.

Références

- ¹ Haute autorité de santé (HAS), Recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP). Idées et conduites suicidaires chez l'enfant et l'adolescent : prévention, repérage, évaluation, prise en charge, 2021-09, 30 p.
- ² Observatoire national du suicide (ONS). Suicide : État des lieux des connaissances et perspectives de recherche. 2014-11, 176 p., ann.
- ³ Direction générale de la santé (DGS). Stratégie nationale de prévention du suicide, feuille de route Santé mentale et psychiatrie. 2023-03, 99p
- ⁴ Inserm, CépiDC, Période de 2020 à 2022, nombre de décès moyen annuel - Exploitation : CREAI-ORS/ORM Occitanie
- ⁵ Santé Publique France (SpFrance) - Point épidémio – Santé mentale – Édition Occitanie, #5, 2023-08-24, 9p.
- ⁶ Observatoire National du Suicide (ONS) : Suicide : connaître pour prévenir. Dimensions nationales, locales et associatives, février 2016, 481p

Suicide et tentatives de suicide


DANS LE DEPARTEMENT DE L'ARIEGE



Passages aux urgences pour geste suicidaire sur l'année 2024

184 passages aux urgences générales en moyenne par an pour geste suicidaire en Ariège

Part des passages aux urgences générales pour geste suicidaire pour 1000 passages codés :



68 % de femmes

32 % d'hommes

2 services d'urgence dans le département

49 254 passages au total (tous diagnostics codés) sur l'année 2024


◇ Sources : Santé Publique France Occitanie, traitement des données SurSauD 2024

Hospitalisations pour tentatives de suicide sur la période 2021 - 2023

Un taux d'hospitalisation pour tentative de suicide supérieur au taux régional

Taux annuel moyen standardisé pour 100 000 ariégeois "consommants"* âgés de 10 ans ou plus

*Bénéficiaires de l'ensemble des régimes d'Assurance maladie ayant eu recours à des soins remboursés au cours des trois dernières années (2021 à 2023) - Personnes résidant dans la zone géographique considérée



163 Ariégeois hospitalisés pour TS en moyenne chaque année

62 % de femmes


38 % d'hommes

Un taux d'hospitalisation pour TS particulièrement élevé chez les jeunes filles de 10 à 19 ans et les jeunes femmes de 20 à 29 ans - Avec un pic de 15 à 19 ans

39 Jeunes filles et femmes de 10 à 29 ans en moyenne par an

18 Jeunes garçons et hommes de 10 à 29 ans en moyenne par an

1,95 pour 1000 des filles de 10-14 ans
3,31 pour 1000 des filles de 15-19 ans
2,65 pour 1000 des femmes de 20-24 ans
2,02 pour 1000 des femmes de 25-29 ans



Taux brut annuel moyen d'hospitalisation pour TS pour 100 000 habitants âgés de 10 ans et plus

Mode opératoire de tentatives de suicide entre 2021 et 2023


 **L'auto-intoxication médicamenteuse constitue le mode opératoire** dans 69 % des cas^Δ**

 **150** Séjours*** pour TS par auto-intoxication médicamenteuse

 **218** Séjours*** pour TS tous modes confondus

Létalité globale

Nombre de décès à la suite d'une hospitalisation pour tentative de suicide entre 2021 et 2023 tous modes opératoires confondus, pour 1000 patients hospitalisés pour TS. Données cumulées sur la période 2021 à 2023. Prudence dans l'interprétation de la létalité dans l'Ariège car elle est calculée à partir d'effectifs faibles (< 10 patients)




**Les modes ne sont pas exclusifs. Pour chaque année, un patient peut être compté autant de fois qu'il a de modalités de tentative de suicide.

***Moyenne annuelle sur la période 2021 à 2023.


Mortalité^Δ par suicide sur la période 2020-2022

En moyenne, 23 décès par suicide chaque année

► **Avec un taux standardisé annuel moyen de décès par suicide supérieur à la moyenne régionale**
(pour 100 000 habitants âgés de 10 ans ou plus) :



► **Part du suicide dans la mortalité générale :**
(toutes causes confondues)





Les décès par suicide concernent majoritairement les hommes :
(77% d'hommes au niveau régional et 75% d'hommes au niveau national)



Un taux de décès par suicide particulièrement élevé chez les hommes âgés (85 ans et plus) :

Taux brut annuel moyen de décès pour 100 000 habitants âgés de 10 ans et plus





orsm-occitanie.fr



Conception - Rédaction :

Estelle Dellapina (FERREPSY-ORSM), Inca Ruiz (CREAI-ORS-ORSM), Alexandrine Salis (FERREPSY-ORSM), Marie Loison (FERREPSY-ORSM), Jean-Loup Chappert (Santé publique France Occitanie), Leslie Simac (Santé publique France Occitanie)



Appui et relecture

Philippe Raynaud de Prigny (FERREPSY-ORSM), François Olivier (FERREPSY-ORSM), Damien Mouly (Santé publique France Occitanie)

Publication Juillet 2025

05 61 43 78 52



orsm-occitanie@ferrepsy.fr



L'ORSM est co-porté par la FERREPSY Occitanie et le CREAI-ORS Occitanie, avec le soutien financier de l'ARS